

التهاب الشغاف:

- يجب اجراء فحص الدم وقياس الحرارة كل 4 ساعات لمدة 24 ساعة
على الاقل بين الزرع.

- ايكو قلب

- فحص الدم وقياس الحرارة كل 4 ساعات لمدة 24 ساعة

- للتشخيص نستخدم معايير duke

العلاج في التهاب الشغاف

وجود حساسية للبنسلين	المرضى	العلاج	الحالة السريرية
صمام طبيعي			
Vanco 15-30mg/kg + Genta 3mg/kg	Amoxicillin100mg/kg + Genta 3mg/kg	العقديات الفموية Oraux s.bovis enterococcus	سير تحت حاد لالتهاب المرضى - إصابة دسامة سابقة المرضى - المدخل الاسنان او غير المرضى
Vanco15-30mg/kg + Genta 3mg/kg	Cloxacilline100mg/kg + Genta 3mg/kg	Staphylococcus	- سير حاد - مريض مدمن - المرضى المرضى المرضى المرضى محيطية او مركزية
Vanco + Genta	Amoxi 100mg/kg + Genta 3mg/kg	Enterococcus Streptococcus	بؤرة الدخول الجهاز الهضمي او البولي
	Vanco15-30mg/kg +Genta 3mg/kg	Streptococcus Staphylococcus	المرضى المرضى

علاج التهاب الشغاف حسب نتائج الزرع الجرثومي

التهاب الشغاف بالعقديات الحساسة للبنسيلين:

التهاب الشغاف غير البنسيلين	التهاب الشغاف غير البنسيلين	التهاب الشغاف غير البنسيلين	التهاب الشغاف غير البنسيلين	التهاب الشغاف غير البنسيلين	التهاب الشغاف غير البنسيلين
يمكن العلاج بلاموكسيسيلين اسابيع	15 D 15 D	IV IV	100mg/kg 3mg/kg	Amoxicilline + Genta	التهاب الشغاف غير البنسيلين
	4 WK	IV	30mg/kg	Vanco	في حال الحساسية للبنسيلين
في الحساسية نستعمل الفانكوميسين بدلا من الاموكسيسيلين	4WK 2WK	IV IV	100mg/kg 3mg/kg	Amoxicilline + Genta	التهاب الشغاف البنسيلين

المقصود بالتهاب الشغاف غير المختلط: دسام طبيعي
في ظل غياب وجود خراج او صدمة او علامات لتوضع خارج قلبي

التهاب الشغاف بالمكورات المعوية او العقديات ذات

$CMi > 0.1$ الحساسية المتوسطة على البنسيلين

التهاب الشغاف غير البنسيلين	التهاب الشغاف غير البنسيلين	التهاب الشغاف غير البنسيلين	التهاب الشغاف غير البنسيلين	التهاب الشغاف غير البنسيلين	التهاب الشغاف غير البنسيلين
يستخدم الفانكوميسين في حال الحساسية للبنسيلين	4WK 15 D	IV IV	150- 200mg/kg 3mg/kg	Amoxi + Genta	التهاب الشغاف غير المختلط
يستخدم الفانكوميسين في حال الحساسية للبنسيلين	6WK 15 D	IV IV	150- 200mg/kg 3mg/kg	Amoxi + Genta	التهاب الشغاف البنسيلين

❑ التهاب الشغاف بالعنقوديات:

المرحلة	المدة	طريق الإعطاء	الجرعة	الدواء	الملاحظات
يستخدم الفانكوميسين للبنسيليّن	4-6WK	IV	100mg/kg	Cloxacillin +	الميتسيلين
	3-7 D	IV	3mg/kg	Genta	
	4-6WK	IV	30mg/kg	Vanco +	مقاومة للميتسيلين
	4-6WK	IV	3mg/kg	Genta	
	4-6wk	IV	30mg/kg	Vanco +	عنقوديات مقاومة للميتسيلين و الجنّتاميسين
		IV	300- 600mg/12hr	Rifampicin	

❑ التهاب الشغاف مع زرع دم سلبية:

	4-6WK	IV	30mg/kg	Vanco +	
		IV	3mg/kg	Genta	