

الانتانات البولية العلوية عند الاطفال

الاستطباب	الصاد	الجرعة اليومية	طريق الاعطاء	مدة العج	ملاحظات
انتان بولي علوي المنشأ	Ceftriaxone + Genta	50mg/kg	IV	3 D	تحويل للشكل الفموي بعد ٤٨ ساعة من زوال الحرارة مدة العلاج الكلية ١٥ يوم
		6mg/kg	IV	48 HR	
التهاب البروستات الحاد غير المختلط	Levofloxacin او Cotrimoxazole	500 mg	IV او PO	4-6 WK	
		800/160 *2	IV/PO	4-6WK	
التهاب البروستات الحاد المختلط	Levofloxacin + Genta او	500 mg 1*1	IV	4-6WK	يحول للشكل الفموي بعد ٤٨ ساعة من زوال الحرارة و حسب نتائج الزرع و التحسس
		6mg/kg	IV	2-4 D	
	Ceftriaxone + Genta	1 g 1*1	IV/IM	4-6WK	
		6mg/kg	IV	2-4 D	
التهاب البروستات المزمن	Levofloxacin او Cotrimoxazole Fort	500 mg 1*1	PO	3 Mn	
		800/160 1*2	PO	3Mn	

ملاحظة:

التهاب البروستات المختلط: تجرثم دم-خراجة-انسداد -سكري-نقص مناعة

[Type text]

[Type text]

[Type text]