

# ذات الرئة المكتسبة بالمنفسة

## VAPs

- عند الشك بحدوث ذات الرئة المكتسبة بالمنفسة تطبق المعالجة التجريبية بالصادات واسعة الطيف حتى تتم معرفة العامل الجرثومي المسبب.
- تعتمد المعالجة الأولية على معرفة الفلورا الجرثومية التي تختلف من مشفى لآخر.
- عوامل الخطورة لوجود عوامل مقاومة تتضمن: تهوية آلية أكثر من خمسة أيام استشفاء قريب (آخر ٩٠ يوم) عناية تمريضية منزلية المعالجة في عيادة تحال دموي استخدام الصادات (آخر ٩٠ يوم).
- المعالجة التجريبية تتضمن:
  - فانكوميسين الينزوليد و سيبروفلوكساسين
  - سيفيم وجنتاميسين\الميكاسين\توبراميسين
  - فانكوميسين الينزوليد وسيفتازيديم
  - يوريدوبنسيلين مع مثبطات بيتالكتاماز مثل بييراسيلين\تازوباكتام او تيكارسيلين\كلافولانات.
  - كاربينيم(ايميبينيم او ميروبينيم)
- تبدل المعالجة عند معرفة العامل المسبب و تستمر حتى زوال الاعراض (بعد ١٤ ٧ يوم)
- عند مرضى ذات الرئة المكتسبة بالمشفى غير المسببة بالعصيات سلبية الغرام(مثل بسودوموناس اكتينوباكتر) يوصى بمدة معالجة اقل او تساوي عشرة ايام.